

Doktorunuzun uyarıları


Doktorunuz gelecek muayene için size bağırsaklarınızı temizleyecek olan PLEINVUE® ilacını yazdı. "İlacı kullanmadan önce prospektüsü dikkatlice okuyun ve ilacı mutlaka prospektüste anlatıldığı veya doktorunuzun ya da eczacınızın belirttiği şekilde kullanın. Ayrıntılı bilgi için lütfen doktorunuza veya eczacınıza başvurun." Özel uyarılar, yan etkiler ve Pleinvue®'nun depolanması gibi diğer önemli bilgiler, kullanım bilgileri bölümünde yer almaktadır.

## Muayeneden önce gün içindeki öğünlerle ilgili uyarılar:

- Hafif bir kahvaltı
- Hafif bir öğle yemeği  
(ilk dozu almadan en az 3 saat önce yenmiş olmalıdır)

Pleinvue® alındıktan sonra klinik muayeneye kadar **katı gıda** tüketilmemelidir!

*Alkol, süt kırmızı veya mor renkli içecekler (ör. siyah frenk üzümü suyu) veya meyve parçacığı içeren her türlü içecekten kaçınınız.*



## Hazırlanışı

1 paket Pleinvue®'de toplam 3 poşet mevcuttur Doz 1 için: 1 poşet; Doz 2 için: 2 poşet (A+B)



### DOZ 1




Doz 1'in içindekileri, en az 500 ml sıvı alabilecek bir kaba doldurun.



500 ml su doldurun.  
**Toz çözülene kadar karıştırınız.**  
**Bu işlem 8 dakika kadar sürebilir.**

### DOZ 2



Belirlenmiş olan zamanda doz 2'nin (kese A ve B) içeriğini aynı şekilde hazırlayınız.

*Pleinvue® hazırlandıktan sonra hemen içilebilir veya 25°C altında ya da üzeri örtülü şekilde buzdolabında 24 saate kadar muhafaza edilebilir.*

## İlacın kullanımı

Muayeneden önceki akşam Doz 1

Doz 1  
PLEINVUE®\*



0,5 l

+

berrak  
sıvı\*\*



en az 0,5 l



Pleinvue® ve ilave berrak sıvıyı porsiyonlara ayırın ve bunları en az bir saatlik süreye yayarak yudumlar halinde için.\*

İlacı içerken boş bir tuvalete erişebilir mesafede bulunmanız önemlidir.



**DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLMESİ ZORUNLU**

Tarih/Saat

\*Sıvı eksikliğini (dehidrasyon) önlemek amacıyla Pleinvue® kullanımı öncesinde, sırasında ve sonrasında berrak sıvılar tüketebilirsiniz. Ek olarak doktor tarafından belirtilen miktarlarda berrak sıvı içmeniz önemlidir.

\*\*Alkol, süt kırmızı veya mor renkli içecekler (ör. siyah frenk üzümü suyu) veya meyve parçacığı içeren her türlü içecekten kaçınınız.

## İlacın kullanımı

Muayene sabahı Doz 2 (1. dozdan yakl. 12 saat sonra)

Doz 2 (A+B)  
PLEINVUE®\*



0,5 l

+

berrak  
sıvı\*\*



en az 0,5 l



Pleinvue® ve ilave berrak sıvıyı porsiyonlara ayırın ve bunları en az bir saatlik süreye yayarak yudumlar halinde için.\*

İlacı içerken boş bir tuvalete erişebilir mesafede bulunmanız önemlidir.




**DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLMESİ ZORUNLU**

Tarih/Saat

**KOLAY İPUCU:** Pleinvue'yu soğuk olarak ve/veya pipet ile için. Midenizi "ısıtmak" için Pleinvue'dan önce sıcak çay için. Alternatif olarak Pleinvue yudumlarınız arasında sıcak çayınızdan yudumlar alabilirsiniz. (Yeşil çay, melisa otu, zencefil ya da limonlu çay gibi bitkisel çaylar.) Bu süreler arasında sakız çiğneyin, naneli şeker ya da limon veya portakal dilimi emin.

## Muayene



**Her türlü sıvı tüketimini sonlandırın:**

- Genel anestezi uygulanan klinik muayeneden **iki saat önce** veya
- Genel anestezi uygulanmayan klinik muayeneden **bir saat önce**

**DOKTOR TARAFINDAN BELİRTİLMESİ ZORUNLU**

Tarih/Saat

İlacın son kullanımından sonra kolonoskopiye gitmek için yeterli zaman bırakın. **UYARI: Genel anestezi altında yapılan bir muayeneden sonra araç kullanamazsınız. (Sigorta teminatı geçersiz hale gelir)**