

# Օգտագործման ցուցումներ

Դեղն ընդունելը քննության առավոտը



Ցուցումներ Ձեր բժշկի կողմից

Ձեր բժիշկը ձեզ հաստ ադիքի մաքրման համար PLEINVUE® է նշանակել զալիք բուժգործողությունը նախապատրաստվելու համար: Ուշադիր կարդացեք այս տուփի ներդիրն ամբողջությամբ՝ նախքան այս դեղորայքն ընդունելը, և միշտ այն ընդունեք ճշգրտորեն՝ ինչպես նկարագրված է այս ներդիրում կամ ինչպես որ հրահանգել են ձեր բժիշկը կամ դեղագործը: Լրացուցիչ կարևոր տեղեկատվության համար՝ ներառյալ Pleinvue®-ի վերաբերյալ հատուկ նախազգուշացումները, կողմնակի ազդեցությունները և պահպանման պահանջները, տես փաթեթի տեղեկատվական թերթիկը:

Ցուցումներ, թե ինչ ուտել օրվա ընթացքում քննությունից առաջ.

- թեթև նախաճաշ
- թեթև լանչ
- Եթե քննության օրվա առավոտյան եք դուք ընդունում Pleinvue®-ն, կարող եք նախորդ երեկոյան արգանակ և/կամ առանց հավելումների յոգուրտ ուտել:
- Այս դեպքում երեկոյան կերակուրը պետք է վերջացնել երեկոյան ժամը 8-ի կողմերը:

Մի կերեք որևէ պինդ կերակուր Pleinvue®-ն ընդունելն սկսելուց հետո մինչև կլինիկական գործողության ավարտը:

Մի խմեք ալկոհոլ, կաթ, կարմիր կամ մանուշակազույն խմիչքներ (ինչպես, օրինակ՝ սև հաղարջի հյութը) կամ պտղամիս պարունակող որևէ այլ խմիչք:

### ԱՌՄՎՈՏ

Մոտավորապես առավոտյան ժամը 6-ի և 10-ի միջև



### ԼԱՆՉ

Մոտավորապես կեսօրից՝ ժամը 12-ի և կեսօրն անց ժամը 2-ի միջև



### ՆԱԽՈՐԴ ԵՐԵԿՈՒ

Սկսած մոտավորապես երեկոյան ժամը 8-ից



## Պատրաստումը

1 տուփի Pleinvue®-ն պարունակում է ընդհանուրը 3 սաշե: Դեղաչափի 1-ի համար՝ 1 սաշե Դեղաչափի 2-ի համար՝ 2 սաշե (A+B)



### ԴԵՂԱՉԱՓ 1




Դատարկեք դեղաչափի 1-ի պարունակությունը այնպիսի տարայի մեջ, որը կարող է տեղավորել առնվազն 500 մլ հեղուկ:



**Չոր ավելացրեք մինչև 500 մլ: Լավ խառնեք, մինչև փոշին լուծվի: Այս գործողությունը կարող է տևել մինչև 8 րոպե:**

### ԴԵՂԱՉԱՓ 2



Պատրաստել 2 դեղաչափի պարունակությունը (սաշե Ա և Բ) նույն ձևով, ինչպես և նշանակված ժամանակ:

Պատրաստելուց հետո Pleinvue® -ն կարելի է ամփոփապես խմել կամ ծածկած պահել 25°C ջերմաստիճանի ներքո կամ մինչև 24 ժամ՝ սառնարանում:

# Դեղն ընդունելը

## Դեղաչափ 1 քննության օրվա առավոտը

Դեղաչափ 1  
PLEINVUE®\*



0.5 լ

+

Թափանցիկ  
հեղուկ\*\*



ըսպե 0.5 լ



**Pleinvue-ն, ինչպես նաև լրացուցիչ թափանցիկ հեղուկը խմեք չափաբաժիններով և կումերով՝ առնվազն 1 ժամվա ընթացքում։\***

ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

Աշխատեք մոտ գտնվել ազատ զուգարանի, հենց որ սկսում եք լուծույթը խմել։



\* Դուք կարող եք թափանցիկ հեղուկ խմել նախքան Pleinvue® ընդունելը, այն ընդունելու ընթացքում կամ դրանից հետո՝ ջրազրկվելուց խուսափելու համար։

\*\* ջուր, արգանակ, մրգահյութ առանց պտղամսի, զովացուցիչ խմիչքներ, թեյ և/կամ սուրճ առանց կաթի

# Դեղն ընդունելը

## Դեղաչափ 2 քննության օրվա առավոտը (≥2 ժամ հետո)

Դեղաչափ 2 (A+B)  
PLEINVUE®\*



0.5 լ

+

Թափանցիկ  
հեղուկ\*\*



ըսպե 0.5 լ



**Pleinvue-ն, ինչպես նաև լրացուցիչ թափանցիկ հեղուկը խմեք չափաբաժիններով և կումերով՝ առնվազն 1 ժամվա ընթացքում։\***

ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

Աշխատեք մոտ գտնվել ազատ զուգարանի, հենց որ սկսում եք լուծույթը խմել։



ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԿ. Pleinvue-ն խմեք ստուգված և/կամ ձողիկի միջոցով։ Pleinvue-ից առաջ խմեք տաք թեյ՝ ստամոքսը «տաքացնելու» համար, կամ էլ ընդունեք խմեք մի քանի կում տաք թեյ՝ Pleinvue-ի կումերի միջև։ (Բուսական թեյերը, ինչպիսիք են կանաչ թեյը, պատրիճը, կոճապղպեղը կամ կիտրոնի թեյը)։ Այս ժամանակահատվածներում մաստակ ծամեք, մենթոլի համով կոնֆետ կերեք կամ էլ կիտրոնի կամ նարնջի կտորներ։

## Քննություն



**Դադարեցրեք որևէ հեղուկ ընդունելը՝**

- ընդհանուր անզգայացմամբ կլինիկական գործողությունից երկու ժամ առաջ, կամ
- առանց ընդհանուր անզգայացման կլինիկական գործողությունից մեկ ժամ առաջ

ԸՆԴՈՒՅԵԼ ՄԻԱՅՆ ԲԺՇԿԻ ՑՈՒՑՄԱՍԲ

Օր/ժամ

Խնդրում ենք խմելը վերջացնելուց հետո բավարար ժամանակ հատկացնել կողմնակապիտայի գնալու համար։  
**ԱՄԵՎՈՐ Է՝ Ձեզ չի թույլատրվում մեքենա վարել ընդհանուր անզգայացման պայմաններում զննում անցնելուց հետո։ (Ապահովագրության ծածկույթ չկա)**