

كاتب بيط / كاتب بيط نم تاداشر!

لقد أوصاك طبيبك/طبيبتك بإجراء تطهير للأمعاء باستخدام PLEINVUE® استعدادًا للفحص القادم. اقرأ نشرة العبوة الكاملة بعناية، قبل بدء استخدام هذا الدواء، والتزم دائمًا بتناول الدواء بالشكل الموصوف في النشرة أو حسب تعليمات طبيبك أو الصيدلي الذي تتعامل معه. لمزيد من المعلومات يُرجى. لمزيد من المعلومات المهمة، بما في ذلك التحذيرات الخاصة، والآثار الجانبية، وتخزين PLEINVUE®، يُرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام.

صباحًا حوالي الساعة 6.00-10.00
ظهرًا حوالي الساعة 12.00-14.00



مساءً



إرشادات بخصوص تناول وجبات الطعام في اليوم السابق للفحص:

- إفطار خفيف
- غداء خفيف

(يجب إنهائه قبل ٣ ساعات على الأقل من تناول الجرعة الأولى)

غير مسموح بتناول أي طعام صلب من بداية استخدام PLEINVUE® وحتى بعد الإجراء السريري!

لا تتناول الكحوليات، أو الحليب، أو المشروبات ذات اللون الأحمر أو الأرجواني (مثل عصير الكشمش الأسود) أو أي مشروبات أخرى تحتوي على ألب الفواكه.



التحضير
تحتوي العبوة الواحدة من PLEINVUE® على 3 أكياس; للجرعة 1: كيس واحد للجرعة 2: كيسان (A+B)

الجرعة 1

املأ الإناء بمقدار 500 مل من الماء.
قم بالتقليب حتى يذوب المسحوق. يمكن أن تستغرق هذه العملية حوالي 8 دقائق.




ضع محتوى الجرعة 1 في إناء يتسع لمقدار 500 مل من السائل على الأقل.



الجرعة 2

٢. قم بتحضير محتوى الجرعة ٢ (الكيس A و B) في الوقت المحدد بنفس الطريقة.

بمجرد تحضيره، يمكن تناول PLEINVUE® على الفور أو الاحتفاظ به في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية أو تغطيته في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعات.



تناول الدواء

الجرعة 1 في الليلة السابقة للفحص



الجرعة 1
PLEINVUE®*
قئار لئاس**
على الأقل 0.5 لتر

قسم Pleinvue مع سائل صاف آخر إلى حصص واشربها على مدار ما لا يقل عن ساعة.

قبول طملا ةي بظلا تامول عمل

التاريخ/الوقت

أثناء تناول الجرعة احرص على التواجد بالقرب من
تواليت غير مشغول.



*يمكنك تناول سائل نقيه قبل وأثناء وبعد تناول Pleinvue®، لتجنب نقص السوائل (جفاف). من المهم أن تتناول بشكل إضافي الكميات الموصوفة من السوائل الصافية.
**الماء، الحساء الرائق، عصائر الفواكه دون لب الفواكه، المشروبات الغازية، الشاي، و/أو القهوة دون حليب

تناول الدواء

الجرعة 2 في صباح يوم الفحص (حوالي ١٢ ساعة بعد الجرعة الأولى)



الجرعة 2 (A+B)
PLEINVUE®*
قئار لئاس**
على الأقل 0.5 لتر

قسم Pleinvue مع سائل صاف آخر إلى حصص واشربها على مدار ما لا يقل عن ساعة.

قبول طملا ةي بظلا تامول عمل


التاريخ/الوقت

أثناء تناول الجرعة احرص على التواجد بالقرب من
تواليت غير مشغول.



نصيحة مفيدة: تناول Pleinvue باردًا و/أو باستخدام شفاطة. اشرب كوبًا من الشاي الدافئ قبل Pleinvue لتهيئة معدتك، أو خذ رشقات من الشاي الدافئ بين رشقات Pleinvue.
(أنواع الشاي العشبي مثل الشاي الأخضر أو بلسم الليمون أو الزنجبيل أو شاي الليمون). بين هذه الأوقات، امضغ بعض اللبان أو قم بمص حلوى المنثول أو شرائح الليمون أو البرتقال.

الفحص



قبول طملا ةي بظلا تامول عمل

التاريخ/الوقت



توقف عن تناول أي سوائل:

قبل ساعتين من الإجراء السريري
تحت التخدير الكامل، أو

قبل ساعة من الإجراء السريري دون
التخدير الكامل

يُرجى التخطيط لتوفير وقت كافٍ، بعد تناول الجرعة الأخيرة،
للذهاب إلى موعد تنظيف الأمعاء الذي ستقوم به. هام: إذا كنت قد
خضعت لتخدير عام، لا يجوز لك القيادة بعدها.
(لا يشترط وجو غطاء تأميني)